



Stigning i vildtudbyttet

Det samlede vildtudbytte i 1999/2000 steg med 8,1 pct.

Gråænder, ringduer, krager, edderfugle og fasaner steg mest

Det samlede vildtudbytte i sæsonen 1999/2000 steg med 205.400 stk. til 2.731.200 stk. vildt i forhold til forrige sæson. Årlige svingninger i vildtudbyttet afspejler for de fleste vildtarters vedkommende svingninger i bestandenes størrelse.

Væksten i det samlede vildtudbytte skyldes først og fremmest en stigning i udbyttet af nedlagt fuglevildt (se tabel 1). Den største stigning ses hos gråænder med 61.200 stk. og hos ringduer med 60.700 stk. Derefter følger store stigninger i udbyttet af krager på 23.800, af edderfugle på 23.100 og af fasaner på 22.100 stk.

Tabel 1.

Udbyttet af nedlagte fugle

	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00
	1 000 stk.							
I alt	2.729,2	2.662,8	2.487,1	2.585,2	2 288,9	2 280,6	2 246,3	2 457,7
Agerhøns	97,0	111,0	105,0	94,0	73,0	65,0	57,0	53,0
Fasaner	840,0	893,0	806,0	812,0	728,0	705,0	742,0	764,1
Fiskehejre	1,4	1,6	1,3	1,4	1,9	2,2	1,7	1,9
Skovsneppe	34,0	30,0	27,0	27,0	28,0	22,0	25,0	24,4
Bekkasiner	24,0	23,0	26,0	24,0	22,0	20,0	18,0	21,6
Regnspøve	7,4	5,2	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Gråænder	679,0	686,0	719,0	768,0	634,0	643,0	670,0	731,2
Andre svømmeænder	133,0	119,0	146,0	155,0	89,0	94,0	89,0	99,3
Edderfugle	150,0	103,0	104,0	114,0	84,0	106,0	72,0	95,1
Andre dykænder	55,0	52,0	45,0	45,0	39,0	36,0	34,0	33,0
Gæs	16,0	16,0	15,0	16,0	16,0	15,0	18,0	17,8
Blishøns	30,0	20,0	17,0	18,0	14,0	13,0	14,0	19,6
Måger ²	79,0	63,0	43,0	47,0	45,0	41,0	38,0	36,1
Ringduer	355,0	316,0	259,0	262,0	276,0	288,0	239,0	299,7
Tyrkerduer	12,0	9,8	8,6	9,9	9,9	10,7	8,4	9,0
Råger	79,0	91,0	82,0	81,0	99,0	84,0	92,0	102,5
Krager	78,0	68,0	50,0	69,0	78,0	81,0	75,0	98,8
Alliker	5,0	3,8	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Husskader	48,0	43,0	29,0	38,0	43,0	43,0	43,0	44,6
Skovskader	6,4	6,8	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Skarver	.. ¹	1,6	2,4	3,0	3,7	4,3	3,6	3,7
Stære	.. ¹	.. ¹	1,8	0,9	5,4	7,4	6,6	2,3

Anm. En vildtsæson går fra 1. april til 31. marts.

¹ Angiver, at tal ikke foreligger. Arterne er totalfredede, men enkelte nedlagte dyr kan forekomme i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader.

² Fra jagtsæsonen 1994/95 er hættemåger og stormmåger blevet totalfredet, og det er fortrinsvis sølvmåger, der er skudt siden. I 1996/97 blev der skudt 36.000 sølvmåger, 8.800 svartbag samt 200 sildemåger.

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.



Harer sætter ny bundrekord Udbyttet af harer er igen faldet markant med 6.800 stk. til 99.200 stk. vildt fra 1998/99 til 1999/2000. Det fremgår af tabel 2, at antallet af nedlagte harer er på et væsentligt lavere niveau end tidligere, det har været faldende siden vildtstatistikens start i 1941.

Ræveudbyttet faldet Ræveudbyttet er faldet med 1.100 stk. til 43.900 stk. vildt i sæsonen 1999/2000.

Tilbagegang i udbygget af små rovdyr Udbyttet af kaniner og husmår er gået tilbage i den seneste jagtsæson. Ilder-udbyttet er uændret.

Mink Der blev registreret 8.000 stk. nedlagte mink, hvilket er en lille stigning.

Tabel 2. Udbyttet af nedlagte pattedyr

	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00
	1 000 stk.							
I alt	319,0	348,2	316,0	326,5	315,4	283,3	279,5	273,5
Krondyr	2,3	2,5	2,4	2,9	3,5	3,3	3,3	3,4
Dådyr	3,6	4,1	4,0	3,7	4,3	4,1	3,8	4,2
Sikahjorte	0,3	0,3	0,4	0,4	0,7	0,7	0,5	0,4
Rådyr	87,0	103,0	98,0	105,0	110,0	101,0	101,0	103,8
Harer	167,0	184,0	164,0	162,0	136,0	113,0	106,0	99,2
Kaniner	12,0	7,9	5,6	6,0	5,2	4,6	7,5	5,0
Egern	0,2	0,1	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Ræve	37,0	37,0	34,0	38,0	44,0	42,0	45,0	43,9
Grævlinger	1,0	0,9	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Ildere	0,7	0,9	0,7	0,7	1,4	1,8	1,1	1,1
Lækatte	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Mink	4,3	3,6	3,4	4,6	6,0	8,0	6,7	8,0
Husmår	3,6	3,9	3,5	3,2	4,3	4,8	4,6	4,5
Oddere	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Spættet sæl	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹

Anm. En vildtsæson går fra 1. april til 31. marts.

¹ Angiver, at tal ikke foreligger. Arterne er totalfredede, men enkelte nedlagte dyr kan forekomme i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader.

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.

Vildtudbyttet af nedlagte pattedyr og fugle er blevet registreret siden 1941/42. Den officielle danske vildtstatistik bygger på jægerens oplysninger i forbindelse med fornyelsen af jagttegn. Det danske jagtterræn omfatter skønsmæssigt 60.000 km², hvilket giver et vildtudbytte på gennemsnitligt 46 stk. vildt pr. km² jagtterræn i den seneste jagtsæson. Der var i sæsonen 1999/2000 170.800 personer med gyldigt jagttegn. To ud af tre jægere nedlagde vildt i sæsonen. De jægere, der fik vildtudbytte, nedlagde i gennemsnit 24 stykker vildt.

Mere information Mere detaljerede oplysninger om *Vildtstatistikken* vil fremover kunne ses i Faglige rapporter fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, under Miljø- og Energiministeriet.

Næste offentliggørelse Statistikken om vildtudbyttet vil ikke fremover blive offentliggjort i *Nyt fra Danmarks Statistik*. For fremtiden vil vildtstatistikken alene kunne ses i Danmarks Statistikbank www.statistikbanken.dk

Henvendelse Vibeke Ravn Sørensen, tlf. 39 17 33 16, vkr@dst.dk