



Nyt fra Danmarks Statistik

Vildtudbyttet i 1998/99

Nr. 121 Dato 17.3.00

Emnegruppe: Miljø og energi

Nedgang i vildtudbyttet

**Det samlede
vildtudbytte i 1998/99
faldt 1,5 pct.**

Det samlede vildtudbytte i sæsonen 1998/99 faldt med ca. 38.000 stk. til 2.526.000 stk. vildt i forhold til forrige sæson. Årlige svingninger i vildtudbyttet afspejler for de fleste vildtarters vedkommende svingninger i bestandenes størrelse.

Vildtudbyttet af nedlagte pattedyr og fugle er blevet registreret siden 1941/42. Den officielle danske vildtstatistik bygger på jægerens oplysninger i forbindelse med fornyelsen af jagttegn. Det danske jagtterræn omfatter skønsmæssigt 60.000 km², hvilket giver et vildtudbytte på gennemsnitligt 42 stk. vildt pr. km² jagtterræn i den seneste jagtsæson. Der var i sæsonen 1998/99 171.000 jagttegnslødere, hvilket er det samme som for sæsonen 1997/98 og også for 1996/97.

**Harer sætter ny
bundrekord**

Udbyttet af harer er igen faldet markant med 7.000 stk. til 106.000 stk. vildt fra 1997/98 til 1998/99. Det fremgår af tabel 1, at antallet af nedlagte harer er på et væsentligt lavere niveau end tidligere, og at der ses et fald i vildtudbyttet siden vildtstatistikens start i 1941.

Tabel 1.

Udbyttet af nedlagte pattedyr

	1941/42- 1945/46	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
	1 000 stk.								
I alt	478,0	291,4	319,0	348,2	316,0	326,5	315,4	283,3	279,5
Krondyr	0,4	2,1	2,3	2,5	2,4	2,9	3,5	3,3	3,3
Dådyr	1,4	3,8	3,6	4,1	4,0	3,7	4,3	4,1	3,8
Sikahjorte	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,7	0,7	0,5
Rådyr	17,0	78,0	87,0	103,0	98,0	105,0	110,0	101,0	101,0
Harer	422,0	142,0	167,0	184,0	164,0	162,0	136,0	113,0	106,0
Kaniner	...	16,0	12,0	7,9	5,6	6,0	5,2	4,6	7,5
Egern	...	0,2	0,2	0,1	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Ræve	23,0	40,0	37,0	37,0	34,0	38,0	44,0	42,0	45,0
Grævlinger	3,5	1,1	1,0	0,9	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Ildere	7,9	0,9	0,7	0,9	0,7	0,7	1,4	1,8	1,1
Lækatte	...	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Mink	...	3,3	4,3	3,6	3,4	4,6	6,0	8,0	6,7
Husmår	1,7	3,6	3,6	3,9	3,5	3,2	4,3	4,8	4,6
Oddere	0,3	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Spættet sæl	0,6	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹

Anm. Gennemsnit for femårsperioderne. Opgørelsesperiode 1. april til 31. marts.

¹ Angiver, at tal ikke foreligger. Arterne er totalfredede, men enkelte nedlagte dyr kan forekomme i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader.

Kilde: Materiale fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.

Ræveudbyttet steget

Ræveudbyttet er steget med 3.000 stk. til 45.000 stk. i sæsonen 1998/99.

Tilbagegang i udbyttet af små rovdyr

Udbyttet af mink, ildere og husmår er gået tilbage i den seneste jagtsæson. Minken er et fremmed og uønsket rovdyr i den danske natur, og der blev registreret 6.700 stk. nedlagte mink i seneste jagtsæson.

Tabel 2.

Udbyttet af nedlagte fugle

	1941/42- 1945/46	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
	1 000 stk.								
I alt	1 825,8	2.660,0	2.729,2	2.662,8	2.487,1	2.585,2	2 288,9	2 280,6	2 246,3
Agerhøns	324,0	77,0	97,0	111,0	105,0	94,0	73,0	65,0	57,0
Fasaner	321,0	772,0	840,0	893,0	806,0	812,0	728,0	705,0	742,0
Fiskehejre	3,8	1,2	1,4	1,6	1,3	1,4	1,9	2,2	1,7
Skovsneppe	23,0	24,0	34,0	30,0	27,0	27,0	28,0	22,0	25,0
Bekkasiner	60,0	28,0	24,0	23,0	26,0	24,0	22,0	20,0	18,0
Regnspover	32,0	8,5	7,4	5,2	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Gråænder	347,0	673,0	679,0	686,0	719,0	768,0	634,0	643,0	670,0
Andre svøm- meænder	...	153,0	133,0	119,0	146,0	155,0	89,0	94,0	89,0
Edderfugle	129,0	121,0	150,0	103,0	104,0	114,0	84,0	106,0	72,0
Andre dykænder	...	59,0	55,0	52,0	45,0	45,0	39,0	36,0	34,0
Gæs	12,0	16,0	16,0	16,0	15,0	16,0	16,0	15,0	18,0
Blishøns	...	26,0	30,0	20,0	17,0	18,0	14,0	13,0	14,0
Måger ²	158,9	87,0	79,0	63,0	43,0	47,0	45,0	41,0	38,0
Ringduer	137,0	350,0	355,0	316,0	259,0	262,0	276,0	288,0	239,0
Tyrkerduer	...	13,0	12,0	9,8	8,6	9,9	9,9	10,7	8,4
Råger	78,0	88,0	79,0	91,0	82,0	81,0	99,0	84,0	92,0
Krager	222,0	94,0	78,0	68,0	50,0	69,0	78,0	81,0	75,0
Alliker	...	5,8	5,0	3,8	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Husskader	137,0	56,0	48,0	43,0	29,0	38,0	43,0	43,0	43,0
Skovskader	...	7,5	6,4	6,8	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Skarver	...	...	.. ¹	1,6	2,4	3,0	3,7	4,3	3,6
Stære	...	...	.. ¹	.. ¹	1,8	0,9	5,4	7,4	6,6

Anm. Gennemsnit for femårsperioderne. Opgørelsesperiode 1. april til 31. marts.

¹ Angiver, at tal ikke foreligger. Arterne er totalfredede, men enkelte nedlagte dyr kan forekomme i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader.

² Fra jagtsæsonen 1994/95 er hættemåger og stormmåger blevet totalfredet, og det er fortrinsvis sølvmåger, der er skudt siden. I 1996/97 blev der skudt 36.000 sølvmåger, 8.800 svartbag samt 200 sildemåger.

Kilde: Materiale fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.

Udbyttet af edderfugle er faldet med 34.000 stk.

Fra 1997/98 til 1998/99 er vildtudbyttet af fuglevildt faldet med 34.300 stk. til 2.246.300 stk. vildt. Faldet dækker over både fremgange og tilbagegange i udbyttet af de enkelte arter. Udbyttet af edderfugle gik stærkest tilbage sammen med agerhøns og fiskehejre. Nedgangen i edderfugleudbyttet skyldes hovedsagelig en dårlig ynglesæson og dermed en lavere efterårsbestand til jagtsæsonen end normalt, men også dårlige vejrforhold for havjagt.

Sådan får De mere information

Mere detaljerede oplysninger om metoder i *Vildtstatistikken* kan findes i serien *Miljø og energi* (Statistiske Efterretninger).

Næste offentliggørelse

Vildtudbyttet 1999/2000 forventes offentliggjort marts 2001.

Henvendelse

Vibeke Ravn Sørensen, tlf. 39 17 33 16, vkr@dst.dk