

Indhold:

Vildtudbyttet i 1998/99 1


Vildtudbyttet i 1998/99

Det samlede vildtudbytte i 1998/99 faldt med 1,5 pct.

Vildtudbyttet i sæsonen 1998/99 faldt med ca. 38.000 stk. til 2.526.000 stk. i forhold til forrige sæson. Vildtudbyttestatistikken benyttes bl.a. i overvågningen af de jagtbare pattedyr og fugle. Årlige svingninger i vildtudbyttet afspejler for de fleste vildtarters vedkommende svingninger i bestandenes størrelse fra år til år.

Statistik tilbage til 1941/42

Vildtudbyttet af nedlagte pattedyr og fugle er blevet registreret siden 1941/42. Statistikken bygger på jægerens oplysninger i forbindelse med fornyelsen af jagttegn. Det danske jagtterræn omfatter skønsmæssigt 60.000 km², hvilket giver et vildtudbytte på gennemsnitligt 42 stk. vildt pr. km² jagtterræn i den seneste jagtsæson. Der var i sæsonen 1998/99 171.000 jagttegnsløsere, hvilket er det samme som for sæsonen 1997/98 og også for 1981/82, da man begyndte at registrere jægerne.

Figur 1.
Udviklingen i udbyttet af visse nedlagte vildtarter


Anm. Vildtudbyttet fra 1941 til 1980 findes alene opgjort som femårsgennemsnit.

2. Vildtudbyttet af nedlagte pattedyr i 1941/42 - 1998/99

Harer sætter ny bundrekord

Udbyttet af harer er igen faldet markant med 7.000 stk. til 106.000 stk. vildt fra 1997/98 til 1998/99. Det fremgår af figur 1 og af tabel 1 bagerst i artiklen. Antallet af nedlagte harer er på et væsentligt lavere niveau end de tidligere sæsoners vildtudbytte, og der ses et fald i jagtudbyttet helt fra vildtstatistikens start i 1941.

Ræveudbyttet steget

Ræveudbyttet er steget med 3.000 stk. til 45.000 stk. i sæsonen 1998/99.

Tilbagegang i udbyttet af små rovdyr

Udbyttet af mink, ildere og husmår er gået tilbage i den seneste jagtsæson. Minken er et fremmed og uønsket rovdyr i den danske natur, og der blev registreret 6.700 stk. nedlagte mink i seneste jagtsæson.

3. Vildtudbyttet af nedlagte fugle i 1941/42 - 1998/99

Udbyttet af edderfugle faldet med 34.000 stk.

Fra 1997/98 til 1998/99 er vildtudbyttet af fuglevildt faldet med 34.300 stk. til 2.246.300 stk. vildt. Faldet dækker over både fremgange og tilbagegange i udbyttet af de enkelte arter. Udbyttet af edderfugle gik stærkest tilbage sammen med ringduer, agerhøns og fiskehejre. Nedgangen i edderfugleudbyttet skyldes hovedsagelig en dårlig ynglesæson og dermed en lavere efterårsbestand til jagtsæsonen end normalt, men også dårlige vejrforhold for havjagt.

Gæs, skovsnepper og råger

Vildtudbyttet af gæs, skovsnepper og råger er steget igen efter et fald i vildtudbyttet i forrige sæson.

Fasaner og gråænder

Fasaner og gråænder er de to fuglearter med det største vildtudbytte, nemlig ca. 63 pct. af samtlige nedlagte fugle. Både gråænder og fasaner bliver i stort omfang opdrættet og udsat med jagt for øje. Udbyttetallene er derfor uanvendelige som målestok for de vilde bestandes trivsel. Jagtudbyttet af fasaner og gråænder er steget kraftigt fra 1997/98 til 1998/99.

Fredninger

Der må ikke drives jagt på stærene, men der foreligger en mulighed for regulering af bestanden under visse forhold. Antallet af nedlagte stær i sæsonen 1998/99, 6.600 stk., er mindre end forrige år. Der foreligger ligeledes en jagtreguleringsmulighed for skarverne, som fra 1993/94 må bekæmpes under visse forhold. Stigningen til 3.700 stk. i udbytte i sæsonen 1996/97 fortsætter med et udbytte i 1997/98 på 4.300 stk., men i den seneste jagtsæson nedlægges kun 3.600 stk. Hættemåger, stormmåger, regnsponer, skovskader og alliker er totalfredet fra jagtsæsonen 1994/95.


4. Vildtudbyttet i amter og langs kyster 1998/99

Når jægerne indberetter sæsonens vildtudbytte skal de også angive, hvor de har nedlagt vildtet. Der er dog nogen, som alligevel ikke indberetter det, men med forbehold for denne usikkerhed vises figur 2 for grupper af vildtarter. På kortet ses fx gruppen af andefugle, som er defineret ved ænder, edderfugle samt andre dykænder. Vildtudbyttet af denne gruppe er gjort op for hvert amt, idet også nedlagt vildt på havet ud for amtets kyster er talt med til udbyttet for amtet. Det samlede billede af vildtudbyttet i hvert amt er dernæst valgt efter rangordning af hvilken vildtgruppe, der har givet det relativt største vildtudbytte i amtet. Fx ses, at ande-

fugle er den vildtgruppe, der er nedlagt flest af ved Fyns Amts kyster. Se også afsnittet om kilder og metoder samt tabel 3.

Figur 2.

Vildtudbyttet i amter og langs kyster i 1998/99



5. Ændringer i udbytt niveau

Barometer for bestandenes trivsel

For de fleste arters vedkommende kan tendenser og svingninger i udbyttetalene anvendes som en slags barometer for bestandenes trivsel. At anvende udbyttetalene til en sådan tolkning kræver dog, at der tages hensyn til eventuelle ændringer i jægernes muligheder og interesse for at nedlægge de forskellige vildtarter. Der kan fx ske ændringer i jagtloven og i landskabernes biotoper.

Arterne kan opdeles i tre grupper

Arterne i vildtudbyttestatistikken kan deles op i tre grupper:

En gruppe, hvor udbyttetalene er en reel afspejling af bestandenes udvikling, og dermed også viser en reel, om end ofte uigennemskuelig, ændring af de vilkår, arten lever under i naturen.

En anden gruppe, hvor ændringer i jagtloven har været afgørende for udbyttetalene. Her vil der som regel være tale om en nedgang i udbyttet, fordi ændringerne ofte har omfattet indskrænkninger i jagttiden eller i udvalget af lovlige jagtredskaber.

En tredje gruppe, hvor ændringer i jagttraditionerne har medført et forøget eller formindsket jagttryk. Det kan give nogle svært gennemskuelige ændringer i udbyttetalene, som ikke nødvendigvis har relation til bestands- eller biotopforhold.

Krondyr, rådyr og ringduer er gode eksempler på arter, hvor et større udbytte også afspejler større bestande. Andre arter viser et faldende udbyttetal, som modsvares af mindre bestande. Det gælder fx harer og agerhøns. For harer og agerhøns menes nedgangen at hænge sammen med en generel forringelse af livsbetingelserne i det moderne landbrugslandskab.

Ændringer i jagtloven har indflydelse på udbyttet

Ændringer i jagtloven kan som nævnt have indflydelse på udbyttet af de arter, som loven omfatter. For totalfredede arter som for eksempel lækat og spættet sæl, har der i årene inden fredningen som regel været tale om et faldende udbytte. Den spættede sæl blev totalfredet i 1977/78, og lækatten i 1983. Ilderen blev totalfredet i 1982, men må bekæmpes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om vildtskader. Egernet, som blev totalfredet den 1. april 1990, må ligeledes kun skydes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om vildtskader. Udbyttet af grævlinger er i perioden fra vildtstatistikens indførelse i 1941 faldet jævnt fra 3.500 stk. til en totalfredning fra og med sæsonen 1994/1995.

Vedrørende jagten på vandfuglene har især flytningen af jagtstarten til 1. september i praksis bevirket en fredning af visse arter i visse landsdele, fx i fuglebeskyttelsesområderne i Nissum Fjord, Horsens Fjord og på Endelave. Det vil bidrage til en nedgang i udbyttet, men vil ikke være en afspejling af et fald i bestanden.

Ændringer i miljøet påvirker udbyttet

Som det fremgår af figur 1 og tabel 1 og 2 har udbytteneiveauet for nogle arter undergået markante ændringer siden vildtstatistikens start. Hos arter som fx harer og agerhøns er ændringen til et nyt og lavere niveau sket samtidig og i løbet af få år. Det, at udbyttet af en række arter med stærk tilknytning til dyrkede arealer pludselig og nogenlunde samtidig falder dramatisk, leder naturligvis tanken hen på spørgsmålet, om der er sket ændringer i miljøet, der kan tænkes at have forårsaget tilbagegangen. Netop i efterkrigstiden, hvor udbyttenedgangen er indtruffet, er der sket væsentlige ændringer i landbrugsproduktionen. Arealet med korn er steget betydeligt på bekostning af græs og roer, det alsidige landbrug er blevet erstattet af et intensivt, specialiseret og regionaliseret brug. Agerlandets småbiotoper er i stort omfang blevet sløjfet for at tilgodese landbrugserhvervets stordriftsfordele. Pesticidanvendelsen, med dens negative indvirkning på fødegrundlaget for faunaen, har været tiltagende.

Harer dræbes i trafikken


Andre forhold kan også tænkes at indvirke på bestandsniveauet. For harer kan det således ikke udelukkes, at der dræbes så mange i trafikken, at det kan virke som en begrænsende faktor på forårets ynglebestand. Der kan også visse steder være tale om et for stort jagttryk.

Værdier for vildtudbyttet

Danmarks Statistik offentliggør i den årlige *Landbrugsstatistik* beregninger af både værdien og vægten af vildtudbyttet. Produktionsværdien for vildtstatistikens salgsprodukter beregnes efter internationale regler fastsat i EU-regi. Se desuden afsnittet om kilder og metoder samt tabel 4.

Figur 3.

Produktionsværdien og vægten af vildtudbyttet



6. Usikkerheder i vildtstatistikken

Pligt til indberetning

Antallet af jagttegnslødere har i de seneste 15 år ligget på ca. 171.000 i gennemsnit. Alle jagttegnslødere får tilsendt et girokort til indbetaling af jagttegnsafgiften. På bagsiden af girokortet findes et vildtudbytteskema, som jægerne skal udfylde for den foregående sæson. Fordelingen af nedlagt vildt pr. jæger er meget skæv, idet de fleste jægere nedlægger ganske få stykker vildt på en sæson. 37 pct. af alle jagttegnslødere indberettede, at de ikke havde nedlagt vildt i sæsonen 1993/94. For 1994/95 er det opgjort i en specialundersøgelse, som har generel karakter, at 25 pct. af jægerne nedlagde mere end 25 stk. vildt hver, hvilket svarer til, at de nedlagde omkring 70 pct. af det samlede vildtudbytte.

Hver femte jæger undlader at indberette

Trods forpligtelsen til at indberette manglede der oplysninger fra 22 pct. af jægerne vedr. jagtsæsonen 1993/94, svarende til knap hver femte jæger, denne jagtsæson. Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, gennemførte derfor en undersøgelse for at få oplyst dels, hvorfor jægerne manglede at indberette og dels, hvilken konsekvens de manglende indberetninger har på niveauet og fordelingen af vildt i vildtudbyttestatistikken. Der blev sendt spørgeskemaer ud til et repræsentativt udsnit på knap 1.200 af de jægere, der ikke havde indsendt de lovpligtige oplysninger efter jagtsæsonen 1993/94.

Undersøgelsen viste, at fire ud af fem jægere begrundede den manglende indberetning med, at det var en forglemmelse eller, at de ikke havde nedlagt vildt og derfor ikke havde noget at indberette.

Vildtudbyttet skønnet for højt

Vildtudbyttestatistikken er hvert år blevet offentliggjort med en opregning af vildtudbyttet for de manglende indberetninger, idet det antages, at de jægere, der ikke indberetter, i gennemsnit nedlægger lige så meget vildt, som de jægere, der indberetter. Den foreliggende spørgeskemaundersøgelse viser dog, at denne opregning giver et for højt vildtudbytte. Undersøgelsen viser dels, at de jægere, der ikke i første omgang afleverede et udfyldt vildtudbytteskema, havde et gennemsnitligt jagtudbytte på 5,7 stk. vildt, og dels, at de jægere, der afleverede, havde et gennemsnitligt jagtudbytte på 17,3 stk. vildt. Ved den anvendte opregning af vildtudbyttet overvurderes vildtudbyttet således for den gruppe jægere, som ikke indsender et udfyldt vildtudbytteskema, og det er beregnet, at overvurderingen for 1993/94 var på 14 pct. Der er intet i vildtstatistikken for 1993/94, der tyder på, at denne jagtsæson afviger fra de øvrige jagtsæsoner, hvorfor graden af overvurdering må formodes at være den samme i hele perioden.

Et redskab til overvågning

Det primære formål med vildtudbyttestatistikken er at følge udviklingen i jagtudbyttet af de forskellige vildtarter og overvåge bestandenes størrelse og trivsel. En overvurdering af vildtudbyttet, som den nævnte, hindrer ikke målopfyldelsen med statistikken, idet der ikke ændres på de enkelte vildtarters vægtning. Udviklingstendenser i vildtudbyttet afsløres stadig igennem statistikken. Det er derfor valgt fortsat at anvende den hidtidige opregningsmetode af hensyn til muligheden for at beregne dækkende udviklingstendenser.

7. Yderligere oplysninger

Definitioner

Det danske jagtterræn er det areal af Danmark, hvor landet ikke er dækket af byer, veje m.m. samt det danske fiskeriterritorium ud til 20 meters dybde.

Jagtbare fugle og pattedyr er de vildtarter, som det er tilladt at skyde i jagtsæsonen. Det indebærer, at nedlagte arter, som det ikke er tilladt at skyde, ikke er medtaget i statistikken. Der kan dog forekomme udbyttetotal for enkelte arter alligevel,

fx egern, som der ikke må drives jagt på. Det skyldes, at der er en reguleringsmulighed af bestanden efter bekendtgørelsen om vildtskader.

En totalfredet art er en art, der ikke har jagttid.

Kilder og metoder

Denne artikel er udarbejdet på baggrund af materiale fra Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, Kalø.

Når jægerne indberetter sæsonens vildtudbytte skal de angive, hvor de har nedlagt vildtet. Der er dog nogen, som alligevel ikke indberetter det, men med forbehold for denne usikkerhed kan tabel 3 opstilles med et amtsfordelt vildtudbytte for grupper af vildtarter fastlagt i Danmarks Statistik. *Hjortevildt* er defineret som kron-, då- og rådyr samt sikahjorte. *Andre pattedyr* er de øvrige vildtarter vist i tabel 1. *Landfugle* er agerhøns, skovsnepper, bekkasiner, regnspover, gæs, duer, krager, råger og stære. *Andefugle* er ænder, edderfugle og andre dykænder. *Andre havfugle* er måger, skarver, blishøns og fiskehejre. Fra tabel 2 resterer der kun *fasaner*, som er defineret som en gruppe for sig selv, idet den ikke er en oprindelig dansk ynglefugl, og den primært opdrættes til jagtformål.

Vildtudbyttet er gjort op for hvert amt, idet også nedlagt vildt på havet ud for amtets kyster er talt med til udbyttet for amtet. Amterne er rangordnet med tallet fra 1-14 for hver gruppe nedlagt vildt. Tallet 1 er givet til amtet med det største vildtudbytte osv. Det samlede billede af vildtudbyttet i hvert amt er dernæst valgt efter rangordning af hvilken vildtgruppe, der har givet det relativt største vildtudbytte i amtet. (Det laveste tal i tabel 3).

Danmarks Statistik offentliggør i den årlige *Landbrugsstatistik* beregninger af både værdien og vægten af vildtudbyttet. Vildtstatistikens *produktionsværdi* angiver værdien af producent for vildtudbyttet. Værdien af vildtstatistikens *salgsprodukter* omfatter det samlede salg af de produkter, der prissættes, nemlig: krondyr, dådyr, sikahjort, rådyr, harer, kaniner, agerhøns, fasaner, ringduer, gråænder, andre svømmeænder, edderfugle, andre dykænder, gæs, skovsnepper, samt bekkasiner.

Henvendelse

Vibeke Ravn Sørensen, tlf. 39 17 33 16, vkr@dst.dk

En tilsvarende opgørelse for 1997/98 er offentliggjort i indeværende serie 1999:4.

Tabel 1. Udbyttet af nedlagte pattedyr

	1941/42	1951/52	1961/62	1971/72	1981/82	1991/92	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
	1945/46	1955/56	1965/66	1975/76	1985/86							
	1 000 stk.											
I alt	478,0	510,9	501,1	413,9	316,8	291,4	348,2	316,0	326,5	315,4	283,3	279,5
Krondyr	0,4	0,8	0,6	0,8	1,7	2,1	2,5	2,4	2,9	3,5	3,3	3,3
Dådyr	1,4	1,6	1,9	1,7	1,8	3,8	4,1	4,0	3,7	4,3	4,1	3,8
Sikahjorte	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7	0,7	0,5
Rådyr	17,0	23,0	30,0	33,0	50,2	78,0	103,0	98,0	105,0	110,0	101,0	101,0
Harer	422,0	402,0	375,0	292,0	197,8	142,0	184,0	164,0	162,0	136,0	113,0	106,0
Kaniner	...	8,8	12,0	10,0	6,3	16,0	7,9	5,6	6,0	5,2	4,6	7,5
Egern	...	16,0	14,0	14,0	2,7	0,2	0,1	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Ræve	23,0	40,0	56,0	52,0	45,4	40,0	37,0	34,0	38,0	44,0	42,0	45,0
Grævlinger	3,5	3,1	2,6	1,6	1,5	1,1	0,9	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Ildere	7,9	7,3	3,0	2,5	1,6	0,9	0,9	0,7	0,7	1,4	1,8	1,1
Lækatte	...	6,2	3,0	2,6	0,4	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Mink	...	...	...	0,8	1,4	3,3	3,6	3,4	4,6	6,0	8,0	6,7
Husmår	1,7	1,0	2,1	2,4	5,8	3,6	3,9	3,5	3,2	4,3	4,8	4,6
Oddere	0,3	0,2	0,2	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Spættet sæl	0,6	0,6	0,4	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹

Anm. Der foreligger alene gennemsnit for femårsperioderne frem til 1979/80. Opgørelsesperiode 1. april til 31. marts.

¹ Angiver, at tal ikke foreligger. Arterne er totalfredede, men enkelte nedlagte dyr kan forekomme i henhold til bekendtgørelsen om vildtskader.

Kilde: Materiale fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.

Tabel 2. Udbyttet af nedlagte fugle

	1941/42	1951/52	1961/62	1971/72	1981/82	1991/92	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
	1945/46	1955/56	1965/66	1975/76	1985/86							
	1 000 stk.											
I alt	1 825,8	2 231,3	2 531,5	2 824,2	2 575,7	2 660,0	2 662,8	2 487,1	2 585,2	2 288,9	2 280,6	2 246,3
Agerhøns	324,0	319,0	233,0	203,0	57,0	77,0	111,0	105,0	94,0	73,0	65,0	57,0
Fasaner	321,0	374,0	562,0	730,0	675,8	772,0	893,0	806,0	812,0	728,0	705,0	742,0
Fiskehejre	3,8	4,9	4,6	5,7	1,1	1,2	1,6	1,3	1,4	1,9	2,2	1,7
Skovsnepper	23,0	21,0	18,0	18,0	18,0	24,0	30,0	27,0	27,0	28,0	22,0	25,0
Bekkasiner	60,0	49,0	61,0	74,0	42,4	28,0	23,0	26,0	24,0	22,0	20,0	18,0
Regnspøver	32,0	46,0	44,0	34,0	12,2	8,5	5,2	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Gråænder	347,0	502,0	370,0	366,0	599,2	673,0	686,0	719,0	768,0	634,0	643,0	670,0
Andre-svømmeænder	...	...	145,0	142,0	139,0	153,0	119,0	146,0	155,0	89,0	94,0	89,0
Edderfugle	129,0	79,0	115,0	153,0	151,0	121,0	103,0	104,0	114,0	84,0	106,0	72,0
Andre dykænder	...	117,0	104,0	107,0	75,2	59,0	52,0	45,0	45,0	39,0	36,0	34,0
Gæs	12,0	8,4	8,9	8,5	11,8	16,0	16,0	15,0	16,0	16,0	15,0	18,0
Blishøns	...	...	...	85,0	59,0	26,0	20,0	17,0	18,0	14,0	13,0	14,0
Måger ²	158,9	98,5	134,2	220,0	147,8	87,0	63,0	43,0	47,0	45,0	41,0	38,0
Ringduer	137,0	285,0	398,0	325,0	242,0	350,0	316,0	259,0	262,0	276,0	288,0	239,0
Tyrkerduer	...	...	...	...	9,9	13,0	9,8	8,6	9,9	9,9	10,7	8,4
Råger	78,0	78,0	81,0	110,0	81,8	88,0	91,0	82,0	81,0	99,0	84,0	92,0
Krager	222,0	187,0	199,0	290,0	155,0	94,0	68,0	50,0	69,0	78,0	81,0	75,0
Alliker	...	...	...	...	9,0	5,8	3,8	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Husskader	137,0	161,0	188,0	173,0	75,0	56,0	43,0	29,0	38,0	43,0	43,0	43,0
Skovskader	...	...	...	...	13,5	7,5	6,8	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹	.. ¹
Skarver	...	...	...	...	...	.. ¹	1,6	2,4	3,0	3,7	4,3	3,6
Stære	...	...	...	...	...	.. ¹	.. ¹	1,8	0,9	5,4	7,4	6,6

Anm. Der foreligger alene gennemsnit for femårsperioderne frem til 1979/80. Opgørelsesperiode 1. april til 31. marts.

¹ Angiver, at tal ikke foreligger. Arterne er totalfredede, men enkelte nedlagte dyr kan forekomme i henhold til bekendtgørelsen om vildtska-

² Fra jagtsæsonen 1994/95 er hættemåger og stormmåger blevet totalfredet, og det er fortrinsvis sølvmåger, der er skudt siden. I 1996/97 blev der skudt 36.000 sølvmåger, 8.800 svartbag samt 200 sildemåger.

der.

Kilde: Materiale fra Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø.

© Danmarks Statistik 2000
Formidlingscenter
Titel: Miljø og energi
Serie: Statistiske Efterretninger
ISSN 1399-0675

Abonnement tegnes hos Danmarks Statistik,
Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Giro 7 11 38 11, fax 39 17 39 99
E-post dst@dst.dk, internet http://www.dst.dk
Abonnement: Tlf. 39 17 30 20
Abonnementspris for året 2000 450,00 kr.
inkl. 25 pct. moms.

Enkeltnumre kan købes gennem boghandelen
eller Danmarks Statistik.
Pris: 32,00 kr. inkl. 25 pct. moms.
Ved telefonisk eller skriftlig bestilling tillægges
et ekspeditionsgebyr til dækning af porto mv.
Danmarks Statistiks trykkeri, København

Tabel 3. Rangordning af nedlagt vildt fordelt på amter

Amter	Hjorte- vildt	Andre patte- dyr	Fasa- ner	Land- fugle	Ande- fugle	Andre hav- fugle	Hjorte- vildt	Andre patte- dyr	Fasa- ner	Land- fugle	Ande- fugle	Andre hav- fugle
	rangordning af vildtudbyttet						1 000 stk.					
Københavns	14	14	14	11	14	9	1	3	5	23	7	3
Frederiksborg	11	12	8	6	11	11	4	5	18	46	32	2
Roskilde	13	13	4	8	12	12	3	4	45	39	29	2
Vestsjællands	3	6	2	1	3	2	11	15	185	97	106	7
Storstrøms	5	1	1	2	2	4	10	23	192	65	107	7
Bornholms	12	11	9	14	13	14	3	6	16	18	10	1
Fyns	1	3	3	3	1	1	15	17	143	55	196	8
Sønderjyllands	8	7	13	13	7	8	8	13	8	19	43	3
Ribe	10	10	12	10	8	13	6	11	9	23	42	2
Vejle	7	8	7	12	9	10	9	13	19	21	41	2
Ringkøbing	6	5	11	7	6	5	9	16	12	42	61	6
Århus	2	4	5	5	4	6	13	16	44	47	84	4
Viborg	9	9	10	9	10	7	6	12	15	35	38	3
Nordjyllands	4	2	6	4	5	3	10	18	29	55	68	7

Anm. Værdier skrevet med fremhævet skrift er det relativt højest placerede vildtudbytte for det enkelte amt.

Tabel 4. Produktionsværdien og vægten af vildtudbyttet

	Pattedyr	Fuglevildt	Pattedyr	Fuglevildt
	mio. kr.		tons	
1990/91	31,450	33,334	1 298	1 906
1991/92	31,254	28,725	1 356	1 752
1992/93	34,342	30,218	1 505	1 863
1993/94	34,850	26,458	1 732	1 820
1994/95	33,124	25,487	1 629	1 745
1995/96	35,347	26,365	1 719	1 809
1996/97	37,346	22,818	1 770	1 547
1997/98	34,318	22,772	1 610	1 566
1998/99	34,034	22,906	1 588	1 549

Kilde: Landbrugsstatistikken.